

Übersichtstabelle Impfschema COVID-19-Impfungen für Kinder und Erwachsene ohne/mit Risikofaktoren bzw. Indikation laut Impfplan 2023/2024

	Impfstoff	Impfschema Grundimmunisierung	Impfschema Auffrischung, nach (jeglicher) Exposition
<b>Kinder</b> bis zum vollendeten 6. Lebensmonat	Keine Impfung zugelassen oder empfohlen	Nicht vorgesehen	Nicht vorgesehen
<b>Kinder</b> ab dem vollendeten 6. Lebensmonat bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	<b>Comirnaty Omicron XBB.1.5 (3 Mikrogramm); „maroon cap, dilute to use“, 0,2 ml</b>	<b>Bei fehlender Exposition:</b> Grundimmunisierung mit 3 Dosen <b>möglich, für Kinder mit Risikofaktoren empfohlen</b>	<b>nach (jeglicher) Exposition:</b> einmalige Impfung <b>möglich, für Kinder mit Risikofaktoren empfohlen</b>
<b>Kinder</b> ab dem vollendeten 5. Lebensjahr bis zum vollendeten 12. Lebensjahr	<b>Comirnaty Omicron XBB.1.5 (10 Mikrogramm); „blue cap, no dilution“, 0,3 ml</b>	Grundimmunisierung nicht mehr vorgesehen	Einmalige Impfung <b>möglich, für Kinder mit Risikofaktoren empfohlen</b>
<b>Kinder/Jugendliche</b> und <b>Erwachsene</b> ab dem vollendeten 12. Lebensjahr	<b>Comirnaty Omicron XBB.1.5 (30 Mikrogramm); „grey cap, no dilution“, 0,3 ml</b> <b>Nuvaxovid XBB.1.5; 0,5 ml</b> <b>Ab dem vollendeten 30. Lebensjahr:</b> <b>Spikevax XBB.1.5 (50 Mikrogramm); 0,5 ml</b>	Grundimmunisierung nicht mehr vorgesehen	Einmalige Impfung <b>empfohlen, insbesondere für alle Personen ab 60 und altersunabhängig für Personen mit Risikofaktoren (gelistet unter „Indikation“) sowie Gesundheitspersonal</b>

- Exposition: vorangegangene Infektion oder Impfung.
- Spezielle Impfschemata für schwer immunsupprimierte **Personen**, siehe Kapitel COVID-19 im Impfplan.
- Bei Gesunden wird ein Mindestabstand zu vorangegangener Exposition von 6, idealerweise 12 Monaten empfohlen.
- Bestimmte Risikopersonen (Personen ab 60 Jahren, immunkompromittierte Personen) können schon früher (nach 4 Monaten) geimpft werden. Ein Mindestabstand von 4 Monaten zur vorangegangenen Exposition sollte aber auch hier nicht unterschritten werden.
- **Ein Plattformwechsel (also Wechsel zwischen mRNA-Impfstoffen und Proteinimpfstoffen) ist nach 2 oder mehr mRNA-Impfdosen möglich und sollte auf Wunsch der zu impfenden Person bei Verfügbarkeit auch erfolgen.**